

## GEBRAUCHSINFORMATION

**Ventrarctin® Heimtier**, Lösung zum Eingeben für Kleinnager, Frettchen, Zier- oder Singvögel, Brieftauben, Terarriertiere und Kaninchen, die nicht der Gewinnung von Lebensmittel dienen

### 1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Serumwerk Bernburg AG  
Hallesche Landstraße 105b  
06406 Bernburg

### 2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

#### **Ventrarctin® Heimtier**

Lösung zum Eingeben für Kleinnager, Frettchen, Zier- oder Singvögel, Brieftauben, Terarriertiere und Kaninchen, die nicht der Gewinnung von Lebensmittel dienen

Extrakt aus Kamillenblüten, Pfefferminzblättern, Schafgarbenkraut

### 3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Lösung enthalten:

#### **Wirkstoff:**

Extrakt aus

Kamillenblüten, Pfefferminzblättern, Schafgarbenkraut (1:1:1) (1:22)

Auszugsmittel: Wasser 1,0 g

#### **Sonstige Bestandteile:**

Sorbinsäure: 0,002 g

### 4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung unspezifischer Durchfälle und zur Unterstützung der Organfunktion des Magen-Darm-Trakts. Ventrarctin Heimtier ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet vorgesehen ist.

### 5. GEGENANZEIGEN

Keine.

### 6. NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

### 7. ZIELTIERART(EN)

Ventrarctin Heimtier Packungsbeilage 20 ml

Zierfische, Zier- oder Singvögel, Brieftauben, Terrarientiere, Kleinnager, Frettchen oder nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienenden Kaninchen

## **8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

Lösung zum Eingeben; unverdünnt oder mit etwas Flüssigkeit verabreichen.  
1 ml Ventrarctin Heimtier entspricht 17 Tropfen.

### Unterstützende Behandlung unspezifischer Durchfälle:

Zwergkaninchen u. Kaninchen (1,0-3,0 kg KGW):	0,5-1,0 ml / kg KGW
andere Kleinnager (<0,1-1,0 kg KGW)	0,1-0,15 ml / 100 g KGW
Frettchen (0,5-2,0 kg KGW)	0,4-0,5 ml / kg KGW
Terrarientiere (0,1-1,0 kg KGW)	0,1-0,15 ml / 100 g KGW

stündlich wiederholen bis zur Besserung, dann 2-3 x täglich bis zur Genesung.

Zier- und Singvögel	15 ml pro ¼ Liter Tränkwasser
Brieftauben	30 ml pro ½ Liter Tränkwasser

Die bei Durchfallgeschehen wichtigen Therapieprinzipien (z.B. Substitution von Flüssigkeit, Elektrolyten, Energie u.a.) sind als flankierende Maßnahmen zu beachten.

### Unterstützung der Organfunktion des Magen-Darm-Trakts:

Zwergkaninchen und Kaninchen (1,0-3,0 kg KGW)	0,5-1,0 ml / kg KGW
andere Kleinnager (<0,1-1,0 kg KGW)	0,1-0,15 ml / 100 g KGW
Frettchen (0,5-2,0 kg KGW)	0,4-0,5 ml / kg KGW
Terrarientiere (0,1-1,0 kg KGW)	0,1-0,15 ml / 100 g KGW

2-3 x täglich bis zur Genesung.

Zier- und Singvögel	15 ml pro ¼ Liter Tränkwasser
Brieftauben	30 ml pro ½ Liter Tränkwasser

### Dauer der Anwendung:

Das Präparat wird bis zur klinischen Besserung, im Durchschnitt 3 Tage lang, verabreicht.

## **9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Siehe oben unter „Art der Anwendung“

## **10. WARTEZEIT(EN)**

Nicht zutreffend.

## **11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25°C lagern.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 4 Wochen

## **12. BESONDERE WARNHINWEISE**

### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten von Nebenwirkungen einen Tierarzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

Bei Durchfällen, die länger als zwei Tage andauern, bei Blutbeimengungen oder Fieberentwicklung sollte ein Tierarzt aufgesucht werden.

### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Anwender mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Korbblütengewächsen oder Menthol sollten bei der Benutzung von Ventrarctin Heimtier nicht in Kontakt mit der Haut kommen.

## **13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

## **14. DATUM DER FASSUNG DER PACKUNGSBEILAGE**

10.07.2018

---

## **15. WEITERE ANGABEN**

Packungsgröße: 20 ml Glasflasche

Dieses Tierarzneimittel wurde gemäß § 60 AMG (Heimtierparagraph) in den Verkehr gebracht.

04-05-9860/01