

# Gebrauchsinformation

## Name und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist

Serumwerk Bernburg AG, Hallesche Landstr. 105 b, 06406 Bernburg

## Bezeichnung des Tierarzneimittels

Äthakridin-Salbe 5 mg/g

Salbe für Kleinnager, Frettchen, Zier- oder Singvögel, Brieftauben, Terrarientiere und Kaninchen, die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen

## Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile

1 g Salbe enthält:

Wirkstoff: Ethacridinlactat 5 mg

Sonstige Bestandteile: Propylenglycol, Macrogol 4000

## Anwendungsgebiete

Antiseptische Lokalbehandlung bei Verletzungen der äußeren Haut und Genitalschleimhaut sowie zur Anwendung in Wundhöhlen. Verwendbar als lokales Antiseptikum bei Penisvorfall und Präputialverletzungen (z.B. Meerschweinchen). Besitzt antimikrobielle Wirkung, z.B. bei Ballenerkrankungen und Wundbesiedlung nach Abszessspaltung.

## Gegenanzeigen

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

## Nebenwirkungen

In seltenen Fällen kann es, vor allem unter Einwirkung von Sonnenlicht, zu allergischen Hautreaktionen kommen.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

## Zieltierarten

Kleinnager, Frettchen, Zier- oder Singvögel, Brieftauben, Terrarientiere und Kaninchen, die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen

## Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Zur Anwendung auf der Haut- und Schleimhaut.

Äthakridin-Salbe gleichmäßig auf die betroffenen Stellen auftragen bzw. in Wundhöhlen einbringen. Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem therapeutischen Bedarf, zu empfehlen sind

mindestens 3 Tage. Die Behandlung kann nach 7 Tagen wiederholt werden. Vor der Anwendung ist eine Erwärmung der Salbe auf 25-30°C für eine bessere Verteilbarkeit von Vorteil.

#### **Wartezeit**

Nicht zutreffend.

#### **Besondere Lagerungshinweise**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

#### **Besondere Warnhinweise**

##### Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Salbe färbt stark! Tragen Sie bei der Anwendung Schutzhandschuhe.

##### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen

Unverträglichkeiten mit Quecksilbersalzen und anderen Desinfektionsmitteln.

#### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich**

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

#### **Datum der Fassung der Packungsbeilage**

31.07.2015

#### **Weitere Angaben**

Packungsgrößen: Tube mit 25 g

Dieses Tierarzneimittel wurde gemäß §60 AMG (Heimtierparagraf) in den Verkehr gebracht.