

Lakto-Diät-Amino

Diätetisches Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushaltes

Pharmazeutischer Unternehmer

Inropharm
94079 Fürstenzell/Ndb.

Großhändler:
Serumwerk Bernburg AG
Hallesche Landstraße 105 b
06406 Bernburg



Zusammensetzung

Traubenzucker, Bananenmehl, Natriumhydrogencarbonat, Weizenquellmehl, Natriumchlorid, Haferfeinmehl, Leinsamen, Molkenpulver, Hefe getrocknet, Monocalciumphosphat

Inhaltsstoffe

Rohprotein	7 %
Rohfett	1 %
Rohfaser	0,9 %
Rohasche	17 %
Calcium	0,9 %
Phosphor	0,5 %
Natrium	3,6 %
Kalium	1,3 %
Chloride	3,8 %
Lysin	1 %
Methionin	1%

Technologische Zusatzstoffe je kg

Johannisbrotkernmehl (E 410)	20.000 mg
Guarkernmehl (E 412)	45.000 mg
Zitronensäure (E 472)	10.000 mg
Kaliumcitrat (E 332)	4.000 mg
Kaliumchlorid	15.000 mg
Magnesiumchlorid	12.000 mg

Eigenschaften

Durch eine optimale Kombination von Schleimstoffen ist Lakto-Diät-Amino ein Ersatz von Milch- bzw. Milchaustauschern bei Durchfall und anderen Magen-Darmstörungen bei Kälbern, Ferkeln, Lämmern, Ziegenlämmern, Fohlen, Hund und Katze.

Durch seine Bestandteile ist es ein ausgesprochenes Diätetikum, welches dem Tier ausschließlich leicht verdauliche und verwertbare Stoffe zuführt.

Dadurch kommt es zu einer schnellen Ergänzung und Stabilisierung des Energie- und Mineralhaushaltes. Die Mucilaginoso (Mucopolysaccharide) und Kräuter wirken peristaltik-beruhigend und krampf lösend auf den Darm.

Anwendungsgebiete

Diätetischer Milchersatz für Jungtiere (Kälber, Ferkel, Lämmer, Ziegenlämmer, Fohlen, Hund und Katze) bei Durchfall und Ruhr, Dyspepsie, Störungen des Elektrolythaushaltes, Verdauungsstörungen, chronische Tympanie, Floraregenerierung.
Es kann mit tierärztlichen Arzneimitteln kombiniert werden.

Zieltierarten

Kälber, Ferkel, Lämmer, Ziegenlämmer, Fohlen, Hunde und Katzen

Fütterungsempfehlung

1 Beutel (100 g) in 2 – 2,5 l lauwarmen Wasser lösen und in 1 – 2 Portionen verabreichen.
Zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushaltes 1 – 3 Tage.
Zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung der Ferkel in 2 – 4 Wochen.
Zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms bei Hund und Katze 1 – 2 Wochen.

Weitere Angaben

Dose 1 kg
Sack 25 kg