

# Boviferm<sup>®</sup> plus<sup>SID</sup>

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber zur Stabilisierung  
des Wasser- und Elektrolyt-Haushaltes

## Pharmazeutischer Unternehmer

chevita GmbH  
Raiffeisenstraße 2  
85276 Pfaffenhofen

## Großhändler:

Serumwerk Bernburg AG  
Hallesche Landstraße 105 b  
06406 Bernburg



## Zusammensetzung

Traubenzucker, Molkenpulver (teilentzuckert), Natriumchlorid, Kaliumchlorid,  
Bananenflocken, Reisquellmehl, Kamille, Pektin, Anis, Fenchel, Calciumchlorid,  
Magnesiumchlorid

## Inhaltsstoffe

Rohprotein	4,0 %
Rohfaser	1,4 %
Rohfett	0,5 %
Rohasche	21,0 %
Natrium	4,4 %
Kalium	3,0 %
Chloride	3,8 %

## Zusatzstoffe je kg

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

Vitamin A (3a672a) 75.000 I. E.

Vitamin E (3a700) 440 mg

Zootechnischer Zusatzstoff:

Enterococcus faecium DSM 10663 / NCIMB 10415 (4b1707) (Oralin<sup>®</sup>) 1,75 x 10<sup>10</sup> KBE

Technologische Zusatzstoffe:

Natriumpropionat (E 281), Guarkernmehl (E412); Bentonit (1m558i) 30.000mg.

## Anwendungsgebiete

Boviferm<sup>®</sup> plus<sup>SID</sup> fördert die Milchverdauung und versorgt das Kalb mit einem  
ausbalancierten Elektrolyt-Komplex, probiotischen Bakterien, Schleim- und Quellstoffen,  
Vitaminen, Mineralstoffen und Nährstoffen.

## Zieltierart

Kälber

### **Fütterungshinweis**

Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall):  
Zweimal täglich 1 Beutel Boviform® plus<sup>SID</sup> in 2 Liter Wasser (max. 50°C) einrühren und mit 0,5-4 Liter Milch oder Milchaustauscher bis zur normalen Tränkemenge ergänzen.  
Milchtränke nicht absetzen! Zusätzlich Wasser zur freien Aufnahme anbieten.  
Boviform® plus<sup>SID</sup> wird über 2 bis 3 Tage verfüttert.  
Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden.  
Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

### **Lagerung**

Kühl und trocken lagern.

### **Weitere Angaben**

Inhalt: 24 x 115 g